

עלון לרכון

קרא' בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י במוצר

מיקוקליר MD – תמיסה לטיפול פטרייתי

מיקוקליר MD הינה תמיסה המסייעת לטיפול ביהום פטרייתי ביצפורניים, בעלת נוסחה משופרת המסייעת לצמיחה בריאה של היצפורן. מסייעת במניעת זיהום פטרייתי ביצפורניים ובשיפור מראה היצפורן. מתאימה לשימוש על היצפורניים של הידיים והרגליים.

מיקוקליר MD מאופיינת במנגנון פעולה ספיקלי המשלב שתי פעולות במקביל. לאחר יישום התמיסה על היצפורן ומסביבה, התמיסה חודרת את שכבת הקרטין של היצפורן ויוצרת פעולות קרטוליטית לקרטין (קילוף כימי עדין של שכבות היצפורן הגנועה). במקביל, התמיסה מזינה את המבנה שמתחת היצפורן בלחות (הידרציה). הפעולה הקרטוליטית מסירה בעדינות את שכבת היצפורן הפגועה ומחליקה את השכבה הצינורית של היצפורן. מרכיבי הלחות מרככים את היצפורן וכך מקלים על קלי הטיפול והגדירה של היצפורן. בגמר תקופת הטיפול בוצרם יצפורן עקרי, חלקה ובעלת מראה בריא ויפה.

רכיבים פעילים:

Benzalkonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Urea.

רכיבים בלתי פעילים:

Purified Water, Propylene Glycol, Allantoin, Hydroxy Ethyl Cellulose, Methylparaben, Cocamidopropyl Betaine, Cocamine Oxide, Triethanolamine, Citric Acid.

התוויה: תמיסה המסייעת לטיפול בזיהום פטרייתי ביצפורניים, מסייעת במניעתו ובשיפור מראה היצפורן.

מתי אין להשתמש במוצר?

אין להשתמש במוצר אידועה רגישות לאחד מרכיבי המוצר. אין להשתמש במידה והעור סביב היצפורן פגוע או פגום. אין להשתמש באיזור של פצעים פתוחים או תחכים. נשים הרות, נשים מיניקות וילדים – אין להשתמש במוצר.

אין להשתמש במוצר מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול במקרים הבאים: אם היך חולה סוכרת/לת המטופלת באינסולין או אם יש לך מירופתיה סוכרתית (פגיעה בקצות העצבים). אם את/ה סובלת או סבלת בעבר מדמי מוצרים המכילים סוכר/דלגמא: אם עברת השתלה, אם היך נוטלת מוצרים המכילים לטיפול בכיפיון ("אפילופיה"), אם היך משתמש/ת בבוטריקוס-טטראציקלים סופוקליים באופן קבוע (על בסיס חודשי), אם היך משתמש/ת באופן קבוע במידיה ידועה רגישות למזון או לתרופה כלשהם, יש להודיע על כך לרופא לפני תחילת השימוש במוצר.

אזהרות: לא לבלועה ולא למאכל! המוצר מיועד לשימוש חיצוני בלבד על היצפורן (לישום על היצפורן) ועל העור שנושק ליצפורן (Cuticle). אין למרוח על העור בטרם יאזורי הגוף. אם למריחה בעיניים יש להימנע ממגע עם העיניים. במידה והתמיסה באה במגע עם העיניים יש לטשטף במים זורמים למשך מספר דקות. במידת הצורך יש לפנות לקבלת עזרה רפואית. אין להשתמש באזור הפנים ועל קמנות ריריות כגון פה, אף, ברתתק וכו'. המוצר מיועד לשימוש במבוגרים ונערים מגיל 12 ומעלה.

גתבות עם תרופות או עם מוצרים אחרים: אין להשתמש ביחד עם לק ליצפורניים: לק בלצבית היצפורניים, לק לחיזוק היצפורניים, וכו'. אם את/ה נוטלת תרופה או מוצר אחר, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה או במוצר אחר, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים אי-יעילות הנובעים מגתבות עם תרופות או עם מוצרים אחרים.

תופעות לוואי: בנוסף לתופעות הרצויה, עלולות להופיע בזמן השימוש תופעות לוואי חלופיות אשר חלופות עם השימוש, כגון: אדמומיות ליעיתים וחוליות תיתכן התקפות העור סביב היצפורניים, אם המוצר

בא במגע עם העור סביב היצפורן. במקרים נדירים תיתכן הגובה אלרגית המתבטאת בדלקת בלוטת ביאזור המגד.

תופעות לוואי: התמיסה תסייעת במניעת תגובה חריפה באזור השימוש, כגון, אדמומיות עזה, חושת צריבה, קצקוץ, שלפוחיות, נפיחות, פריחה, גירוי או קילוף (דיר) שי להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם רופא באופן מיידי. במידה ותופעות אלה משיכות או בכל מקרה של תופעות נלוויות שלא צוינה העלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית – עליך להיוועץ עם הרופא מיד, ובמידת הצורך להפסיק השימוש במוצר.

מינון והוראות שימוש: השימוש במוצר אצל נערים בני 12 ומעלה יעשה בהשגחת מבוגר ובמידת הצורך יישום המוצר יעשה על המבוגר עצמו.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא או מהרוקח: לפני תחילת הטיפול על המוצר, יש לקצר את היצפורן הפגועה ככל האפשר בעזרת מספרים לשייך בעזרת פיירה **תד-פעמית** יש לטשטף את היד או הרגל המטופלות במים וסבון ולייבש היטב לפני המריחה. יש לנער היטב לפני השימוש. יש למרוח מיקוקליר MD פעמיים ביום על היצפורן, מתחת ליצפורן ומסביב לעור הנושק ליצפורן המטופלת. אין לחבש. ניתן לגרוב גרביים בתום 1-2 דקות ולאחר שהחומר נספג ויבש.

במשך כל תקופת הטיפול ניתן להסיר שאריות של שכבת התמיסה עם פדי לאלוהה לשייף את שטח היצפורן עם פיירה **תד-פעמית**.

כיצד תוכלו לסייע בהצלחת הטיפול? יש לנסות להחזיר את התמיסה, במידת האפשר, אל מתחת ליצפורן.

משך השימוש במוצר תלו בחומרת הזיהום. בדרך כלל ניתן להבחין בשיפור במראה היצפורן תוך שבועיים עד שישה שבועות. יש לשמור על יובש במקום המוצר. היצפורניים הרגליים: מומלץ להשתמש בגרביים מכותנה.

שימי/לבו מומלץ להשתמש בתמיסה לא יותר מ- 3 חודשים. צורך בהמשך שימוש מעבר ל- 3 חודשים ייקבע ע"י הרופא. אם לא חל שיפור במצב תוך שישה שבועות יש לפנות לרופא. ניתן להתחיל סדרת טיפול חדשה לאחר הפסקה של 2 חודשים לפחות.

מנעו/הרעלה! יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך מנעו/הרעלה

במקרה של מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן המוצר, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא ארזית המוצר איתך. **אין לגרום להלקאה** לא להשתמש מפורז במרופא!

אין להשתמש במוצר בחושך/בדוקי התווית והמינון **בכל פעם** שהיך משתמש במוצר. יש להרכיב משקפיים אם היך זקוק/ה להם.

אחסנה: לשמור במקום קריר (מתחת ל-15°C), לא לשמור במקרה או במקפיא. אטום היטב את ארזית המוצר לאחר השימוש. אין להשתמש במוצר לאחר תאריך התפוגה המוטבע על הארזה. ניתן להשתמש במוצר למשך 3 חודשים לאחר הפתיחה. הרחק מהישג ידם של ילדים ותינוקות.

באישור משרד הבריאות, אגף לציוד רפואי, אישור מס' 8350413. למכירה בבית מרקחת בידו יוקח בלבד.

המוצר אינו תרופה.

בעל הרישום יוצר: טרי אוף לייף פארמה בע"מ, פ.ח. 513071621,

ת.ד. 799 חל 7110604 טל': 03-5033140.

משווק בלעדית ע"י: לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ

חטישה 8, ת.ד. 3552

פארק התעשייה קיסריה, 3088900

שירות לקוחות: 03-331700-90

גרסה מעודכנת לתאריך: 05/03/19

LAP-MD-PLL-V003R

נشرة למסתייך

אפראי הנشرة בלעמן حتى نهايتها قبل استعمالك للمنتج

מיקוקליר MD – מחلول ללאظفار

מיקוקליר MD הוא מחلول בסיסע על עג העדוץ הפטרית בלאظفار, זו סעיגה מסחנת סעסע על نمو الظفر بشكل سليم. بيساعد في منع العدوى الفطرية باللاظفار وتحسين مظهر الظفر. ملائم للاستعمال على أظفار اليدين والقدمين.

מיקוקליר MD יתמیز במנוظمة عمل فيزيائية تدمج بين عطينين في الوقت ذاته. بعد وضع المحلول على الظفر وحوله، يدخل المحلول إلى طبقة كيراتين الظفر وينتج فعالية انحلال الطبقة القرنية (تفتير كيميائي خفيف لطبقة الظفر المتصلبة). بالمقابل، يغذي المحلول الطبقة الموجودة تحت الظفر بالرطوبة (إضافة الماء). يزيل نشاط انحلال الطبقة القرنية بلطفة طبقة الظفر المتصلبة ويجعل الطبقة الخارجية للظفر لمساء. مركبات الرطوبة تطري الظفر وهكذا تسهل علاج وقص الظفر.

عند الانتهاء من مرحلة العلاج، ينمو ظفر نظيف، أملس وذو مظهر سليم وجميل.

المواد الفعالة:

Benzalkonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Urea.

المواد غير الفعالة:

Purified Water, Propylene Glycol, Allantoin, Hydroxy Ethyl Cellulose, Methylparaben, Cocamidopropyl Betaine, Cocamine Oxide, Triethanolamine, Citric Acid. **الدلالة:** محلول بيساعد على علاج التهاب فطريات الاظافر بيساعد على منع ظهورها على الاظفر وتحسين مظهر الاظفر.

متمى لا يجوز استعمال المنتج؟

يُمنع الاستعمال في حال كانت هناك حساسية معروفة لأحد مركبات المنتج. يُمنع الاستعمال إذا كان الجلد حول الظفر مُصابًا أو متضررًا. لا يجوز الاستعمال في منطقة الجروح المفتوحة أو الشقوق. النساء الحوامل، النساء المرضعات والأولاد – لا يجوز استعمال المنتج.

لا يجوز استعمال المنتج دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج في الحالات التالية: إذا كنت تعاني/ين من السكري ويتم علاجك بواسطة الأنسولين أو إذا كان لديك اعتلال الأعصاب السكري (إصابة في أطراف الأعصاب).

إذا كنت تعاني/ين أو عانيت من كبت جهاز المناعة، على سبيل المثال: إذا اجتزت عملية زرع، إذا كنت تتناولين منتجات وأدوية لعلاج داء الصرع ("الصرع")، إذا كنت تستعملين/كورتيكوستيرويدات موضعية بشكل ثابت (شبهوي)، إذا كنت تستعملين بشكل ثابت أجهزة استئصال تحنوي على ستيرويدات، إذا كنت تعاني من مرض جلدي. في حال كان معروفًا عن حساسية لغذاء أو دواء أي كان، يجب إبلاغ الطبيب بذلك قبل البدء باستعمال المنتج.

تحذيرات: ليس معدًا للإبتلاع، وليس للأكل! المنتج معدًا للاستخدام الخارجي فقط على الجلد (للدهن على الجلد) وعلى الجلد القريب من الظفر (Cuticle). لا يجوز دهنه على الجلد في المناطق الأخرى. ليس معدًا للدهن على العينين ويجب الابتعاد عن ملامسة العينين. في حال لامست المحلول العينين، يجب شطفهما بالماء المنقيض لطبع ففائق. إذا اقتضت الحاجة، يجب التوجه للحصول على مساعدة طبية. لا يجوز الاستعمال في منطقة الوجه وعلى الأنسجة المخاطية مثل، الفم، الأنف، المهبل وما شابه. المنتج مخصص للاستعمال للبالغين والشيباب من عمر 12 وما فوق. **التفاعلات مع الأدوية أو المواد الأخرى:** لا يجوز استعماله مع طلاء الأظفار. إذا كنت تتناولين/أين دواءً آخر، أو إذا انتهيت لتوك من علاج بدواء أو منتج آخر، عليك إبلاغ الطبيب المعالج، بهدف منع المخاطر أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات مع الأدوية أو المنتجات الأخرى.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى الفعالية المرغوب بها، يمكن أن تظهر أثناء الاستخدام أعراض جانبية مؤقتة، تزيّل مع الاستخدام، مثل: احمرار، أحيانًا، قد يحدث تفتير الجلد حول الأظفار، إذا لامس المنتج الجلد حول الظفر. في

حالات نادرة، قد يحدث رد فعل تحسسي، يظهر على شكل التهاب الجلد في المنطقة التي تمت ملامستها.

الأعراض الجانبية التي تترزم أهميًا خاصًا: رد فعل حاد في الموضع الذي تم استعمال المادة فيه، مثل، احمرار حاد، شعور بالحرق، وخز، بثرات، تورم، طفح، تهيج أو تفتير (نادر)، يجب التوقف عن الاستعمال واستشارة الطبيب فورًا. في حال تواصلت هذه الأعراض الجانبية، أو في حال طرأ عارض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على الشعور العام – عليك استشارة الطبيب فورًا، وإذا اقتضت الحاجة، التوقف عن استعمال المنتج.

الجرعة وتعليمات الاستعمال: المنتج لدى الشباب بأعمار 12 وأكثر. سيتم بإشراف شخص بالغ وبموجب الحاجة سيتم استخدام المنتج على يد الشخص البالغ نفسه. متعاة من قبل الطبيب. الجرعة المعصوم بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب أو الصيدلاني:

قبل بدء العلاج بالمنتج، يجب قص الأظفار المتضررة قدر الإمكان بمساعدة مقص، وتشدّد الظفر باستعمال مبزّد معدّ للاستعمال لمرة واحدة. يجب شطف اليدين أو القدم التي تتم معالجتها بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا قبل دهن المادة.

يجب رج الزجاجة جيدًا قبل الاستعمال. يجب دهن مיקوكلير MD مرتين يوميًا على الظفر، تحت الظفر وحول الجلد القريب من الظفر الذي تتم معالجته. لا يجوز التضميد. يمكن لبس الجوارب بعد الانتهاء بدقة أو ارتئتين وبعد أن تم استيعاب المادة وجفافها.

يمكن طوال فترة العلاج إزالة متبقى طبقة المحلول بواسطة شاشات كحولية ويرد منطقة الظفر بواسطة مبزّد معدّ للاستعمال لمرة واحدة.

كيف تستعملين/ين إن تساهمي/ي في نجاح العلاج؟ يجب محاولة إدخال المحلول، قدر الإمكان، تحت الظفر.

مدة استعمال المنتج منوظمة بحدّة التورث. يمكن ملاحظة تحسن مظهر الظفر غالبًا خلال أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع. يجب الحفاظ على جفاف منطقة العلاج. لأظافر الرجلين: يوصى باستعمال جوارب قطنية.

انتبه/ي! يوصى باستعمال المحلول لفترة لا تزيد عن 3 أشهر. تُقرر الحاجة إلى متاعاة العلاج بعد 3 أشهر من الاستعمال من قبل الطبيب. في حال لم يطرأ تحسن على الحالة خلال ستة أسابيع، يجب التوجه إلى الطبيب. يمكن بدء سلسلة من علاج جديد بعد توقف من شهرين على الأقل.

امنع/ي التسمم! يجب الاحتفاظ به في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع. وبذلك تمنع/تحمي التسمم! في حال تناول جرعة مفرطة أو ابتلاع الولد من المنتج عن طريق الخطأ، توجه/ي فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضري عبوة المنتج معك. لا تسيب التفتير دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال المنتج في الظلام! إحصاري الالصفة والجرعة التي تستعملها من المنتج كل مرة يجب وضع نظرات إذا كنت بحاجة إليها.

التخزين: يجب الاحتفاظ به في مكان بارد (أقل من 25 درجة مئوية). يُمنع الاحتفاظ به في الثلجة أو حجرة التجميد. أقل عبوة المنتج جيدًا بعد الاستعمال. يُمنع استعمال المنتج بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة. يمكن استخدام المنتج لمدة 3 أشهر بعد فتحه. ابعده عن متناول أيدي الأطفال والرضع.

بمصادقة وزارة الصحة، قسم المعدرات الطبية، مصادقة رقم 8350413. للتبيع في الصيدلية على يد صيدلي فقط.

المنتج ليس دواء.

صاحب التسجيل: تري أوف لايف فارما مض. شركة خاصة

513071621، ص.ب. 799 اللد 7110604. هاتف: 03-5033140.

تسويق حصري من قبل: لايبديوت ميديكال للاستيراد والتسويق المحدودة

8 شارع هاشميتا، ص.ب. 3552

المنطقة الصناعية في قيساري، 3088900

خدمة العملاء: 03-331700-90

Patient Leaflet

Read the entire leaflet carefully before using the product

MycoClear MD – Nail Solution

MycoClear MD is a solution that helps treat fungal infection of the nails, with an improved solution that assists with healthy nail growth. Helps to prevent fungal infection of the nails and to improve the appearance of the nails. Suitable for use on fingernails and toenails.

MycoClear MD is characterized by a physical mechanism of action that combines two simultaneous actions. Once the solution is applied to and around the nail, the solution penetrates the nail's keratin layer, generating a keratolytic action on the keratin (gentle chemical peeling of the affected nail's layers). At the same time, the solution nourishes the layer under the skin with moisture (hydration). The keratolytic action gently removes the affected nail layer and smoothes the external layer of the nail. The moisturizing agents soften the nails, thereby facilitating nail treatment and cutting.

At the end of the treatment period, grows a clean, smooth, healthy and beautiful looking nail.

Active ingredients:

Benzalkonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Urea.

Inactive Ingredients:

Purified Water, Propylene Glycol, Allantoin, Hydroxy Ethyl Cellulose, Methylparaben, Cocamidopropyl Betaine, Cocamine Oxide, Triethanolamine, Citric Acid.

Indication: Solution to aid in the treatment and prevention of fungal infection of nails and improving nail appearance.

When should the product not be used?

Do not use the product if you have any known sensitivity to any of its ingredients. Do not use if the skin around the nail is injured or damaged. Do not use on open wounds or cuts. Pregnant women, breastfeeding women and children – do not use the product.

Do not use the product without consulting a physician before starting treatment in the following instances: If you are diabetic treated with insulin or if you have diabetic neuropathy (damage to the ends of the nerves). If you are currently suffering or have suffered in the past immune system suppression, for example: if you had a transplant, if you are taking products and medications to treat epilepsy, if you are regularly (monthly) using topical corticosteroids, if you are regularly using inhalers containing steroids, if you suffer from a skin disease. If there is a known allergy to any food or products, inform the physician before you start using the product.

Warnings: Do not swallow. Do not be eaten! The product is intended for external use only on the nail (to be applied onto the nail) and on the skin surrounding the nail (cuticle). Do not apply to other parts of the body. Do not apply to the eyes, and avoid contact with the eyes. If the solution comes in contact with the eyes, rinse well in running water for several minutes. Seek medical assistance if needed. Do not use in the area of the face or on mucosal tissues, such as the mouth, nose, in the vagina etc. This product is intended for use in adults and youth from the age of 12 and up.

Interactions with other medications or products: Do not use together with nail polish: nail polish, nail strengthening polish, etc. You must inform your attending physician if you are taking an additional medication or product, or if you have just completed treatment with another medication or product, in order to avoid risks or inefficacy resulting from interactions with other medications or products.

Side effects: In addition to the desired activity, temporary side effects might occur during the use of this product, which resolve with use, such as: redness. Infrequently, peeling of the skin around the nails might occur, if the product comes in contact with the skin around the nail. On rare

occasions, an allergic reaction might occur that is manifested as a skin inflammation at the contact area.

Side effects that require special attention: Acute reaction at the site of the application, such as, intense redness, burning, tingling, blisters, swelling, rash, irritation or peeling (rare), stop administration and consult a physician immediately. If these effects persist, or in any case of a side effect not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health – consult a physician immediately, and if needed, stop using this product.

Dosing and directions for use: The usage of the product in youth from the age of 12 and up, will be done under an adult supervision and if necessary the application of the product will be done by the adult himself. Standard dosage in the absence of other instructions from the physician or pharmacist:

Before starting treatment with the product, cut the affected nail as short as possible with scissors and file with a disposable nail file. Rinse the treated hand or foot with soap and water and dry well before applying.

Shake well before use. Apply MycoClear twice daily on the nail, under the nail and around the cuticle of the treated nail. Do not bandage. Socks can be worn within 1-2 minutes, and after the solution has been absorbed and dried. The residue of the solution layer can be removed throughout the treatment period with alcohol pads, and the surface of the nail may be filed with a disposable nail file.

How can you facilitate the success of the treatment? Try to apply the solution, to the extent possible, under the nail.

The duration of product use depends on the severity of the infection. Typically, an improvement in the appearance of the nail can be seen within two to six weeks. Keep the treated area dry. For toenails: cotton socks are recommended.

Note! This solution should not be used for more than 3 months. The need to continue treatment beyond 3 months will be determined by the physician. If the condition does not improve within six weeks, consult a physician. A new treatment course may begin after a break of at least 2 months.

Avoid poisoning! Keep in a closed place, out of the reach of children and/or infants, in order to avoid poisoning!

If you have overdosed, or if a child has accidentally swallowed the product, seek immediate medical attention at the hospital emergency room, and bring the product package with you. **Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a physician!**

Do not use the product in the dark! Check the label and the dosage every time you use the product. Wear eyeglasses if you need them.

Storage: Keep in a cool place (below 25°C). Do not store in the refrigerator or freezer. Close the product package well after use. Do not use the product after the expiration date imprinted on the package. The product may be used for 3 months after the opening. Keep out of the reach of children and infants.

Approved by the Ministry of Health, Medical Device Department, Approval No. 8350413.

For sale in a pharmacy by a pharmacist only.

This product is not a medicine.

Manufacturer and Registration Holder: Tree of Life Pharma Ltd., VAT# 513071621, P.O.B. 799 Lod 7110604. Tel: 03-5033140.

Exclusive marketing by: Lapidot Medical Import and Marketing Ltd. 8 Hashita PO Box 3552.

Caesarea Industrial Park, 3088900

Customer Service: 1700-70-90-33

Информационный вкладыш для потребителя

Внимательно прочитайте этот вкладыш до конца перед применением продукта

Микоклир MD – раствор для ногтей

Микоклир MD – это раствор, помогающий в лечении грибковой инфекции ногтей, обладающий усиленным составом, который способствует росту здорового ногтя. Раствор помогает предотвратить развитие грибковой инфекции ногтей и улучшить внешний вид ногтя. Подходит для обработки ногтей рук и ног.

Микоклир MD характеризуется механизмом действия, включающим в себя два параллельных процесса. После нанесения раствора на ноготь и окружающие ткани раствор проникает в кератиновый слой ногтя и оказывает там кератолитическое воздействие (производит мягкое химическое отшелушивание поврежденных слоев ногтя). Одновременно раствор увлажняет нижние слои ногтя (обеспечивает их гидратацию). Кератолитический эффект позволяет мягко удалить поврежденные слои ногтя и сделать его наружную поверхность более гладкой. Увлажняющие компоненты смягчают ноготь и таким образом облегчают уход за ногтем и его подстригание.

По окончании лечения новый ноготь отрастает чистым, гладким и выглядит здоровым и красивым.

Действующие компоненты:

Benzalkonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Urea.

Неактивные компоненты:

Purified Water, Propylene Glycol, Allantoin, Hydroxy Ethyl Cellulose, Methylparaben, Cocamidopropyl Betaine, Cocamine Oxide, Triethanolamine, Citric Acid.

Цель применения: Раствор для помощи в лечении и предотвращении грибковой инфекции на ногтях и для улучшения внешнего вида ногтей.

Противопоказания:

Не следует использовать данный продукт, если известно о чувствительности к одному из его компонентов. Не применять в случае повреждения кожи вокруг ногтя. Не применять на тех участках кожи, где имеются открытые раны или порезы. Запрещается применять продукт беременным, кормящим женщинам и детям.

Не используйте препарат без рекомендации врача перед началом лечения в следующих случаях: Если Вы страдаете сахарным диабетом и получаете инсулин или если Вы страдаете диабетической нейропатией (поражением нервных окончаний); если Вы страдаете или страдали в прошлом от иммуносупрессии, например: если Вы перенесли трансплантацию, если Вы принимаете препараты для лечения эпилепсии, если Вы принимаете местные кортикостероиды на постоянной основе (ежемесячно), если Вы используете на постоянной основе ингаляторы, содержащие стероиды, если Вы страдаете от кожного заболевания. В случае если известно о повышенной чувствительности к кажим-либо пищевым продуктам или лекарственным препаратам, необходимо сообщить об этом врачу до начала использования препарата.

Внимание: Не глотать, не употреблять в пищу! Продукт предназначен только для наружного применения: для обработки ногтей (для нанесения на ноготь) и окружающей ноготь кожи (кутикулы). Не наносите на кожу в других участках тела. Не наносите на глаза и избегайте попадания в глаза. Если произошел контакт раствора с глазами, следует тщательно промыть глаза под проточной водой в течение нескольких минут. При необходимости следует обратиться за медицинской помощью. Не для использования на лице и на слизистой оболочке (например, рта, носа, влагалища и т. д.). Продукт предназначен для взрослых и детей 12 лет и старше.

Взаимодействие с другими препаратами или продуктами: Не применяйте данное средство вместе с лаком для ногтей любого вида – лаком для окрашивания ногтей, для их укрепления и т. д. Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или продукт или только что закончили лечение другим лекарственным препаратом или продуктом, Вы должны сообщить об этом лечащему врачу во избежание рисков или неэффективности, причина которых заключается во взаимодействии с другими лекарственными препаратами или продуктами.

Побочные явления: В дополнение к желаемому эффекту во время применения могут возникнуть временные побочные явления, которые проходят по мере использования, – например, покраснение кожи. Очень редко возможно возникновение шелушения кожи вокруг ногтей – в случае

попадания препарата на окружающую ногти кожу. В редких случаях возможно возникновение аллергической реакции, выражающейся в воспалении кожи в участках попадания препарата.

Побочные явления, которые требуют особого внимания: Сильная местная реакция в области применения препарата – например, сильное покраснение, ощущение жжения, покалывания, появление волдырей, отечность, сыпь, раздражение или шелушение (редко). При возникновении этих явлений нужно немедленно прекратить использование препарата и обратиться к врачу. Если побочные явления не проходят, или в любом случае побочных явлений, не отмеченных в данном информационном вкладыше, или в случае изменения в общем состоянии следует немедленно проконсультироваться с врачом и при необходимости прекратить прием продукта.

Способ применения и дозировка: Использование продукта детьми с 12 лет и старше под наблюдением взрослого. При необходимости применение продукта ребенком предлагает помощь взрослого. Стандартная дозировка при отсутствии других указаний врача или фармацевта:

Перед началом лечения препаратом нужно подстричь поврежденные ногти ножницами (насколько это возможно) и подпилить их одноразовой пилочкой. Перед нанесением средства нужно вымыть руки или ноги с мылом и хорошо вытереть их.

Хорошо встряхнуть перед использованием. Наносите Микоклир MD дважды в день на пораженные ногти, под них и вокруг них, на окружающую их кутикулу. Не закрывайте ногти повязкой. После того, как средство впитается в ноготь и высохнет, через 1–2 минуты можно надевать носки.

На протяжении всего периода лечения можно удалять остатки раствора ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе, и подпилить ногти одноразовой пилочкой.

Как можно способствовать успеху лечения? Попробуйте нанести раствор, насколько это возможно, под ноготь.

Длительность применения данного средства зависит от интенсивности грибкового поражения ногтей. Как правило, можно отметить улучшение внешнего вида ногтя в течение периода времени от двух до шести недель. Следите за тем, чтобы участки кожи и ногти, подвергающиеся лечению, оставались сухими. Для ногтей на ногах: рекомендуется пользоваться хлопчатобумажными носками.

Внимание! Не рекомендуется применять данный раствор дольше 3 месяцев. Необходимо более длительного применения раствора должна определяться врачом. Если в течение шести недель улучшение не наступит, обратитесь к врачу. Новый курс лечения можно начинать после перерыва в лечении длительностью не менее двух месяцев.

Избегайте отравления! Храните препарат в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте – таким образом Вы сможете предотвратить отравление!

Если Вы превысили дозировку или если ребенок по ошибке проглотил препарат, следует незамедлительно обратиться в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку препарата. Запрещается вызывать рвоту без четкого указания врача!

Запрещается использовать продукт в темноте! При каждом использовании продукта проверяйте надписи на этикетке и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке в прохладном месте (при температуре ниже 25°C). Не хранить в холодильнике или морозильной камере. Хорошо закрывайте флакон с препаратом после употребления. Запрещается использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Препарат можно использовать в течение 3 месяцев после первого открытия. Хранить в недоступном для детей и младенцев месте.

Разрешен к применению отделом медицинских устройств и аппаратов при Министерстве здравоохранения, разрешение №8350413.

Отпускается в аптеке исключительно фармацевтом.

Продукт не является лекарственным препаратом.

Владелец лицензии и производитель: Три Оф Лайф Фарма Лтд, частная компания # 513071621, пл/я 799, Лод, 7110604. Телефон: 03-5033140.

Эксклюзивный диллер: Лалидот Медикал Импорт энд Маркетинг Лтд. Ул. Ха-Шита 8, П. Я. 3552.

Индустриальная зона Кейсарим, 3088900

Пункт обслуживания клиентов: 1700-70-90-33